

Coelhos



Existem mais de 50 raças de coelhos em todo o mundo.

O seu tamanho varia entre 18 a 30 centímetros e têm em média 1 a 4 kg.

O período de gestação é de 28 a 35 dias, podendo ter 3 a 6 ninhadas por ano com 4 a 8 crias.

O tempo médio de vida de um coelho doméstico varia entre 5 a 10 anos.

Aconselha-se, logo nos primeiros meses de vida, uma visita ao médico veterinário para uma consulta de nutrição e de medicina preventiva.

As principais doenças dos coelhos

Nos dias de hoje os problemas mais comuns são a mixomatose, a doença vírica hemorrágica, as dificuldades locomotoras, e as alterações dermatológicas.

Sarnas No coelho a sarna é provocada por ácaros que atingem o pavilhão auricular e a pelagem. A transmissão ocorre por contacto direto com animais infetados ou pela partilha do mesmo espaço.

Encefalitozoonose Esta doença é causada por um parasita que se desenvolve no cérebro, meninges e rins. Os animais são contaminados através da urina de coelhos infetados ou de mãe para cria.

Vacinação

O coelho deve ser vacinado anualmente contra a mixomatose e contra a doença vírica hemorrágica Também se pode vacinar contra a pasteurelose. O ciclo de vacinações pode iniciar-se às 5 semanas de idade, mas deve sempre ter em conta o aconselhamento veterinário.

Alertas de saúde

- Anorexia ou falta de apetite.
- Prostração.
- Alterações na cavidade oral (processos traumáticos e sobre crescimento dos dentes incisivos e molares).
- Vômitos.
- Diarreia.
- Problemas de agressividade e territorialidade podem ser indicadores de alterações de comportamento e alterações hormonais.

Maneio

Não se deve pegar o coelho pelas orelhas. A forma correta é segurar o animal pelo dorso ou barriga, apoiando as patas na mão para que não se sinta desequilibrado.



Com que idade devem os coelhos ser esterilizados



As fêmeas devem ser esterilizadas a partir dos 6 meses de idade. Os machos podem ser castrados assim que os testículos sejam palpáveis, por volta dos 3 meses e meio, no entanto, é aconselhado esperar até aos 5 meses de idade.

Razões para esterilizar a sua coelha

A partir dos 6 anos de idade existe uma probabilidade superior a 50% de aparecimento de tumores uterinos em animais não esterilizados.

As fêmeas esterilizadas são menos agressivas, mais sociáveis e são mais fáceis de educar a fazer as suas necessidades em local apropriado.

Razões para castrar o seu coelho

Os machos castrados não marcam o seu território com urina, são menos agressivos e mais sociáveis com os donos e outros animais. Além disso não manifestam o aparecimento de tumores testiculares na idade adulta.

Alimentação

Fibra: Feno, erva fresca, alfalfa, trevo, farelo, pão integral, batata, entre outros.

Verdura: Folhas de couve, folhas de brócolos, folhas de couve flor, folhas de nabo, acelga e cenoura, entre outros.

Rações granuladas compostas: Apresentam um elevado conteúdo em proteína e energia e baixo em fibra.

Complementos ocasionais: Fruta fresca, frutos secos, entre outros.

Água: Os coelhos necessitam de uma grande quantidade de água por dia, 50 a 150ml de água por Kg de peso vivo e não podem estar mais de 24 horas sem beber.

Alojamento

A gaiola deve ter tamanho mínimo suficiente que permita ao coelho esticar-se a todo o comprimento e sentar-se nas patas traseiras, no entanto, este tamanho apenas deve ser utilizado para coelhos que façam exercício diário fora da gaiola.

O local onde esta está instalada, deve ser seco e longe de correntes de ar.

