

Tosse do Canil

Tosse do Canil - O que é?

Trata-se de uma doença altamente contagiosa entre cães. O principal sintoma é um quadro de tosse seca e incomodativa. É também conhecida como traqueobronquite infecciosa canina.

Esta doença é provocada por um conjunto de agentes infecciosos, entre os quais vírus (*Parainfluenza canina* e *Adenovirus*) e bactérias (*Bordetella bronchiseptica*).

A Tosse do Canil é muito frequente e mais agressiva em cachorros jovens, entre as 6 semanas e os 6 meses.



Tosse do Canil - Como é transmitida?

A transmissão ocorre por contacto direto com outros animais infetados ou pelo contacto com secreções libertadas pelas narinas e boca de um animal infetado.

Também pode ser contraída de outras maneiras, como por exemplo: locais com muitos cães (canis); objetos do cão (brinquedos); pelas mãos do próprio dono.

Sinais clínicos:

- Tosse seca incomodativa ;
- Agravamento da tosse devido à excitação;
- Tentativa ou vômito;
- Espirros e descarga mucosa (estado inicial);
- Perda de apetite e febre (casos mais graves).



Como prevenir a Tosse do Canil?

- Isolamento do cão doente;
- Higienização do espaço do canil;
- Repouso total em ambiente ameno ;
- **Vacinação (subcutânea ou intranasal)**